

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm ADULTO

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2025/2026



Os comentários devem ser consultados.

Para recomendações de vacinação para gestantes, consulte os *Calendários de vacinação SBIm gestante*.

Vacinas	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuitas nas UBS*	Serviços privados de vacinação
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche)	Atualizar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT. Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dTpa a cada dez anos.			
dTpa ou dTpa-VIP	Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com dT (tríplice bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tétano.	• A dTpa está recomendada mesmo para aqueles que tiveram a coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente.		
Dupla adulto (difteria e tétano) – dT	Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0-2-4 a 8 meses. para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica: recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP). A dTpa-VIP pode substituir a dTpa.	• O uso da vacina dTpa, em substituição à dT, objetiva, além da proteção individual, a redução da transmissão da <i>Bordetella pertussis</i> , principalmente para suscetíveis com alto risco de complicações, como as lactentes.		
Influenza (gripe)	• Dose única anual. • Em imunodeprimidos e em situação epidemiológica de risco, pode ser considerada uma segunda dose, a partir de 3 meses após a dose anual.	Se a composição da vacina disponível for concordante com os vírus circulantes, poderá ser recomendada aos viajantes internacionais para o hemisfério norte e/ou brasileiros residentes nos estados do norte do país no período pré-temporada de influenza.	SIM, 3V para adultos pertencentes a grupos de risco	SIM, 3V E 4V
Pneumocócicas	Rotina a partir dos 50 anos de idade. Esquemas: • VPC20 em dose única ou • VPC15 em esquema sequencial com uma dose de VPP23, após no mínimo 2 meses. Na impossibilidade da VPC15, usar a VPC13.	As vacinas pneumocócicas são recomendadas para adultos de qualquer idade portadores de algumas comorbidades (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).	NÃO, VPC20, VPC15, SIM, VPC13 nos CRIE para algumas indicações (no esquema sequencial com a VPP23) e a VPP23 para grupos de risco e como rotina para asilados e institucionalizados.	SIM, VPC20, VPC15, VPC13 E VPP23
Herpes zóster	• Rotina a partir de 50 anos. • Esquema: Vacina inativada (VZV) – duas doses com intervalo de dois meses (0-2).	• A vacinação está recomendada mesmo para aqueles que já desenvolveram a doença. Intervalo entre quadro de Hz e vacinação: seis meses ou após resolução do quadro, considerando a perda de oportunidade vacinal. • A VZV está recomendada para vacinados previamente com a vacina atenuada (VZA), respeitando intervalo mínimo de dois meses entre elas. • Use em imunodeprimidos: VZV recomendada (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais)	NÃO	SIM, VZV
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	• Duas doses acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de um mês entre elas. • Para adultos com esquema completo, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo.	• Para suscetíveis, considerar a aplicação de vacina combinada tetraviral (SCRV). • O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).	SIM, duas doses até 29 anos; uma dose entre 30 e 59 anos	SIM
Varicela (catapora)	Para suscetíveis: duas doses com intervalo de um a dois meses.	• Para suscetíveis, considerar a aplicação de vacina combinada tetraviral (SCRV). • O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).	NÃO	SIM
Hepatites A, B ou A e B	Hepatite A: duas doses, no esquema 0-6 meses. Hepatite B: três doses, no esquema 0-1-6 meses. Hepatite A e B: três doses, no esquema 0-1-6 meses.	• Adultos não vacinados anteriormente e suscetíveis, devem ser vacinados para as hepatites A e B. • A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.	NÃO SIM NÃO	SIM NÃO SIM
HPV	• Duas vacinas estão disponíveis no Brasil, HPV4 e HPV9. A SBIm, com o intuito de ampliar a proteção para os tipos adicionais, recomenda, sempre que possível, o uso preferencial da vacina HPV9 em três doses, assim como a revacinação daquelas anteriormente vacinadas com HPV2 ou HPV4. • Adultos com 20 anos ou mais, não vacinados anteriormente: três doses da HPV9 (0-1 a 2-6 meses). • Para revacinação ou para sequência a esquemas iniciados com vacinas HPV2 ou HPV4 consulte posicionamento SBIm: https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/informe-sbim-esclarecimentos-vacinas-hpv-240415-v2.pdf	• Adultos, mesmo que previamente expostos, podem ser vacinados. • A vacinação em maiores de 45 anos (fóra da faixa de licenciamento) pode ser recomendada pelo médico em decisão compartilhada com seu paciente. • Contraindicada para gestantes.	NÃO	SIM, HPV9
Meningocócicas conjugadas ACWY ou C	Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.	Não indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.	NÃO	SIM
Meningocócica B	• A indicação dependerá da situação epidemiológica. • Duas doses com intervalo mínimo de 1 mês (Bexsero®) ou 6 meses (Trumenba®). • Não se conhece a duração da proteção conferida e, consequentemente, a necessidade de dose(s) de reforço.	• Para grupos de alto risco para doença meningocócica invasiva (DMI), os esquemas primários assim como a necessidade de reforços são diferentes (consulte os Calendários SBIm pacientes especiais). • Bexsero® licenciada até os 50 anos de idade. O uso acima dessa idade é off label. • Trumenba® licenciada até os 25 anos. As duas vacinas não são intercambiáveis.	NÃO	SIM
Febre amarela	• Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos de idade: dose única. • Recomendação da SBIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos. • Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.	• É contraindicada em nutririzes até que o bebê complete 6 meses; se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por dez dias. • O uso em imunodeprimidos e gestantes deve ser avaliado pelo médico (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais e/ou Calendário de vacinação SBIm gestante).	SIM	SIM
Dengue	• Odengal® é preferencial, podendo ser utilizada em adultos até 60 anos independente de contato prévio com o vírus da dengue. Esquema de duas doses com intervalo de três meses entre elas (0-3 meses). • Dengvaxia® recomendada somente para adultos soropositivos para dengue até 45 anos. Esquema de três doses com intervalo de seis meses entre elas (0-6-12 meses).	Ambas são contraindicadas para adultos imunodeprimidos, gestantes e lactantes.	NÃO	SIM
Vírus Sincicial Respiratório	• A partir dos 50 anos recomendada para pessoas com cardiopatia ou pneumopatia pelo risco de evolução grave ou descompensação, especialmente se fragilizadas, acamadas e/ou residentes em instituições de longa permanência. Ver Calendário de Vacinação Pacientes Especiais- SBIm	• Duas vacinas disponíveis: Arexxyl® (GSK) e Abrysvo®(Pfizer®), no esquema de uma dose, IM. • Abrysvo® é licenciada pela ANVISA para pessoas com certas condições médicas crônicas dos 18 aos 49 anos. Uso a critério médico. • Somente Abrysvo® (Pfizer®) é licenciada para gestantes, a partir dos 18 anos de idade. Recomendada a partir de 28 semanas de IG, em cada gestação. Uso entre 24 e 27 semanas de IG e em < 18 anos a critério médico.	NÃO	SIM
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19			

19/08/2025 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas • Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

Algunas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial.
Consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*.

* UBS – Unidades Básicas de Saúde

ADULTO